



ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ

НЕОБХОДИМЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ:

- **Мовипреп** – 1 упаковка (2 пакетика «A» и 2 пакетика «B»);
- **Эспумизан L эмульсия** (внутр.40 мг/мл) **флакон 30 мл**

НЕСОБЛЮДЕНИЕ НИЖЕПРИВЕДЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИВЕДЕТ К ПЛОХОЙ ОЧИСТКЕ КИШКИ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ОТМЕНЕ КОЛОНОСКОПИИ ВРАЧОМ-ЭНДОСКОПИСТОМ, В СВЯЗИ СО СНИЖЕНИЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ!!!

ДИЕТА С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КЛЕТЧАТКИ:		
	РАЗРЕШЕНО	ЗАПРЕЩЕНО
За 3 дня до колоно- скопии	- Белое мясо (курица, индейка, кролик), белая рыба без кожи, в отварном, паро- вом или тушеном виде; - Яйца в любом виде; - Нежирные кисломолочные продукты без фруктовых и злаковых наполнителей; - Мёд, сахар; - Прозрачные, процеженные бульоны (овощные и мясные); - Светлые соки без мякоти; - Чай; - Вода.	Вся растительная пища, а также ВСЕ, что не входит в список «РАЗРЕШЕНО»: - Овощи и Фрукты В ЛЮБОМ ВИДЕ; - Ягоды; - Зелень, Специи; - Крупы, Каши, Орехи, Грибы; - Хлебобулочные и Мучные изделия; - Алкоголь, Газированные напитки; - Соки с мякотью, Молоко; - Препараты, окрашивающие кал (препа- раты железа, висмута, активированный уголь и пр.)
За 2 дня до колоно- скопии	При запорах – ежедневно, по утрам, принимать Форлакс 10 г по 2 пакетика до при- ема пищи (содержимое 1 пак. разводят в 1 стакане воды)	
НАКАНУНЕ колоноско- пии (за 1 день)	до 18:00	ДИЕТА – ТОЛЬКО РАЗРЕШЕННЫЕ ЖИДКОСТИ (твердую пищу употреб- лять запрещено)
	20:00	Приготовить 1 литр раствора Мовипреп® (Содержимое одного паке- тика «A» и одного пакетика «B» развести в 1 литре воды) Принять 1 литр раствора Мовипреп® в течение 1 часа, дробно, по 250 мл каждые 15 минут. Во время приема необходима двигательная активность. После окончания приема Мовипреп® принять дополнительно 0,5 литра жидкости в течение 15-30 минут: вода, чай В случае тошноты или позывов к рвоте – рекомендуется после каждого 250 мл раствора Мовипреп® принимать 125 мл воды с добавлением процежен- ного свежеотжатого лимонного сока. В таком случае прием 500 мл жидкости после окончания приема Мовипреп® не требуется.
В ДЕНЬ колоноско- пии	За 4-5 часов до начала колоно- скопии	Аналогичным образом приготовить и принять второй литр раствора Мовипреп® После окончания приема Мовипреп® принять дополнительно 0,5 литра жидкости, с добавлением 30 мл Эспумизана L эмульсии в те- чение 15-30 минут: вода, чай

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ – стул в виде **прозрачной жидкости** желтого цвета